




EEG - elektroencefalogram; EKG - elektrokardiogram; ICD (implantable cardioverter defibrillator) - implantowalny kardiowerter-defibrylator; MAP (mean arterial blood pressure) - średnie ciśnienie tętnicze krwi; OIT - oddział intensywnej terapii; PCI (percutaneous coronary intervention) - przeszskórna interwencja wieńcowa; SBP (systolic blood pressure) - skurczowe ciśnienie krwi; SpO<sub>2</sub> - saturacja tlenem krwi obwodowej; TK - tomografia komputerowa

# DALSZA OPIEKA PORESUSCYTACYJNA U DOROSŁYCH

Zatrzymanie krążenia



Przeprowadź czynnościową ocenę  
zaburzeń somatycznych i psychicznych



Skieruj na rehabilitację,  
jeśli jest wskazana

PRZED WYPISEM  
ZE SZPITALA

Przeprowadź badanie  
przesiewowe w kierunku  
zaburzeń poznawczych



Przeprowadź badanie przesiewowe  
w kierunku zaburzeń emocjonalnych  
i zmęczenia



Udzielaj informacji i wsparcia  
pacjentowi i jego rodzinie



Rozważ skierowanie  
do dalszej opieki  
specjalistycznej,  
jeśli wskazana

DALSZA OPIEKA  
w czasie 3 miesięcy od wypisu ze szpitala